

# Rumenil®

34 mg/ml Suspensión oral para bovinos  
Oxiclozanida



APROBADO SU USO  
EN VACUNO DE LECHE



TRATAMIENTO DE  
**FASCIOLASIS**  
CRÓNICA EN  
ESTADIO ADULTO



KARIZOO

# Rumenil®

34 mg/ml Suspensión oral para bovinos  
Oxiclozanida



APROBADO SU USO  
EN VACUNO DE LECHE

## SUSTANCIA ACTIVA

Oxiclozanida 34,0 mg

## ESPECIES DE DESTINO

Bovinos

## INDICACIONES

Tratamiento de fasciolosis crónica causada por *Fasciola hepática* en estadio adulto sensible a oxiclozanida.

Eliminación de segmentos de tenias grávidas (*Moniezia spp.*).

## DOSIFICACIÓN

Vía oral. Agitar antes de usar.

Dosificación según el peso vivo a razón de 10 mg de oxiclozanida por Kg p.v (bovinos).

### Rumenil®: 3 ml por 10 Kg p.v.

Por ejemplo:

50 kg.....15 ml

100 kg.....30 ml

150 kg.....45 ml

200 kg.....60 ml

250 kg.....75 ml

300 kg.....90 ml

350 kg.....más 105 ml

## La oxiclozanida es un antihelmíntico del grupo salicilanilida.

La oxiclozanida tiene actividad fasciolítica contra el estadio adulto de *Fasciola hepática*. Su eficacia contra cestodos se limita a la eliminación de segmentos de la tenia *Moniezia*.

## USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LA LACTANCIA

Puede utilizarse durante la gestación o lactancia.

## TIEMPO DE ESPERA

Carne: **13 días** / Leche: **108 horas (4,5 días)**

## PERÍODO DE VALIDEZ

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 años.  
Período de validez después de abierto el envase primario: 1 año.

## FORMATO

Envase plástico de 5 litros.

Rumenil 34 mg/ml suspensión oral para bovinos **Sustancia activa:** Oxiclozanida 34,0 mg **Excipientes:** Parahidroxibenzoato de metilo (E218) 2,0 mg Parahidroxibenzoato de propilo 0,2 mg **Especies de destino** Bovinos **Indicaciones de uso, especificando las especies de destino** Tratamiento de fasciolosis crónica causada por *Fasciola hepática* en estadio adulto sensible a oxiclozanida. Eliminación de segmentos de tenias grávidas (*Moniezia spp.*) **Uso durante la gestación, la lactancia** Puede utilizarse durante la gestación o lactancia. **Posología y vía de administración** Vía oral. Agitar antes de usar. Para asegurar la administración de una dosis correcta, el peso vivo debe ser determinado de la forma más precisa posible. **Dosificación** según el peso vivo a razón de 10 mg de oxiclozanida por Kg p.v. (bovinos). Bovinos: 3 ml por 10 Kg p.v. **Tiempo(s) de espera** Bovinos: Carne: 13 días Leche: 108 horas (4,5 días) **Propiedades farmacológicas:** Grupo farmacoterapéutico: Antihelmínticos. Oxiclozanida. Código ATCvet: QP52AG06 **Período de validez** Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 años Período de validez después de abierto el envase primario: 1 año **Precauciones especiales de conservación** Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. **Formato:** 5 L: Envase flexible blanco de polietileno de alta densidad **Titular de la autorización de comercialización** Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Irlanda **Número(s) de la autorización de comercialización** 3465 ESP **Prohibición de venta, dispensación y/o uso** Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.