

K-dox

500 mg/g polvo para administración en agua de bebida o en leche
Doxiciclina



TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS



ALIVIRA
LABORATORIOS KALIZOO S.A.

K-dox



500 mg/g polvo para administración en agua de bebida o en leche
Doxiciclina

Doxiciclina en polvo para el tratamiento de problemas respiratorios en cerdos de engorde, pollos de engorde y terneros prerrumiantes



Cerdos de engorde



Pollos de engorde



Terneros pre-rumiantes

INDICACIONES

Tratamiento de procesos infecciosos incluidos dentro del complejo respiratorio porcino, causados por cepas bacterianas sensibles a la doxiciclina tales como *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Tratamiento de infecciones causadas por cepas bacterianas sensibles a la doxiciclina tales como *Escherichia coli* (colibacilosis) o *Mycoplasma gallisepticum* (Síndrome Respiratorio Crónico).

Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por cepas bacterianas sensibles a la doxiciclina, tales como *Pasteurella multocida* y *Mannheimia haemolytica*.

POSOLOGÍA

23 mg de K-Dox 500 por Kg p.v./día, durante 5 días consecutivos.

17,2 - 34,4 mg de K-Dox 500 por Kg p.v./día, durante 3-5 días consecutivos.

23 mg de K-Dox 500 por Kg p.v./día, durante 5 días consecutivos. Administración por vía oral disuelto en leche.

TIEMPO ESPERA

Carne: 2 días

Carne: 7 días
Huevos: Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. No usar en un plazo de 4 semanas desde el inicio de la puesta

Carne: 7 días
Leche: Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para el consumo humano.

FORMATOS

Bolsa de 200 g y Bolsa de 1 kg

K-Dox 500 mg/g polvo para administración en agua de bebida o en leche. **Sustancia activa:** Doxiciclina (híclato) 500 mg. **Especies de destino** Porcino (cerdos de engorde), aves (pollos de engorde) y bovino (terneros prerrumiantes). **Indicaciones de uso, especificando las especies de destino** Cerdos de engorde: Tratamiento de procesos infecciosos incluidos dentro del complejo respiratorio porcino, causados por cepas bacterianas sensibles a la doxiciclina tales como *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma hyopneumoniae*. Pollos de engorde: Tratamiento de infecciones causadas por cepas bacterianas sensibles a la doxiciclina tales como *Escherichia coli* (colibacilosis) o *Mycoplasma gallisepticum* (Síndrome Respiratorio Crónico). Terneros prerrumiantes: Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por cepas bacterianas sensibles a la doxiciclina, tales como *Pasteurella multocida* y *Mannheimia haemolytica*. **Posología y vía de administración** Pollos y cerdos de engorde: Administración en agua de bebida. Deben seguirse las siguientes recomendaciones de administración: Pollos de engorde: 8,6 - 17,2 mg de hídato de doxiciclina/Kg p.v./día, equivalente a 17,2 - 34,4 mg de medicamento veterinario por Kg p.v./día, durante 3-5 días consecutivos. Cerdos de engorde: 11,5 mg de hídato de doxiciclina/Kg p.v./día, equivalente a 23 mg de medicamento veterinario por Kg p.v./día, durante 5 días consecutivos. Terneros prerrumiantes: Administración por vía oral disuelto en leche deberá emplearse inmediatamente a una dosis de 11,5 mg de hídato de doxiciclina/Kg p.v./día, equivalente a 23 mg de medicamento veterinario por Kg p.v./día, durante 5 días consecutivos. **Tiempos de espera** Bovino (terneros): Carne: 7 días - Leche: Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para el consumo humano. Porcino (cerdos de engorde) Carne: 2 días Aves (pollos de engorde): Carne: 7 días - Huevos: Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. No usar en un plazo de 4 semanas desde el inicio de la puesta. **Propiedades farmacológicas:** Grupo farmacoterapéutico: Antibacterianos para uso sistémico. Tetraciclinas. Código ATCvet: J0114A02. **Formatos:** Bolsa de 200 g y Bolsa de 1 kg. **Titular de la autorización de comercialización** Laboratorios Karizoo, S.A. Polígono Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 - Caldes de Montbui (Barcelona) España. **Número de la autorización de comercialización** 2819 ESP. **Prohibición de venta, dispensación y/o uso** Condiciones de dispensación: Medicamento sujeto a prescripción veterinaria Condiciones de administración: Administración bajo control o supervisión del veterinario

FICHA TÉCNICA COMPLETA

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com



ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.