

# Curofen 50 mg/g

Premezcla medicamentosa para porcino



## FENBENDAZOL



### ANTIHELMÍNTICO DE AMPLIO ESPECTRO

Del grupo de los bencimidazoles que actúa frente a los nematodos gastrointestinales y pulmonares.



### PRODUCE LA MUERTE DE LOS HELMINTOS

Alterando la captación de nutrientes y reduciendo sus niveles de glucógeno.



### AMPLIO ESPECTRO DE ACTIVIDAD

Se caracteriza por un amplio espectro de actividad y un gran margen de seguridad.



KARIZOO

# Curofen 50 mg/g

Premezcla medicamentosa para porcino

## COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:

Fenbendazol ..... 50 mg

## INDICACIONES:

Para el tratamiento de las formas maduras e inmaduras (L<sub>4</sub>) sensibles al benzimidazol de los siguientes nematodos del tracto gastrointestinal y las vías respiratorias del porcino.

*Hyostrongylus rubidus* (gusano rojo del estómago)

*Oesophagostomum* spp. (gusano nodular)

*Ascaris suum* (ascárido del cerdo)

*Trichuris suis* (gusano látigo)

*Metastrongylus apri* (gusano pulmonar)

## FORMA FARMACÉUTICA:

Premezcla medicamentosa  
Polvo blanco.

## ESPECIES DE DESTINO:

Porcino.

Puede usarse en cerdas gestantes o de lactación

## POSOLOGÍA:

Para administración por vía oral una vez incorporado al alimento completo para porcino. El pienso medicado con este medicamento veterinario se puede granular. El proceso de granulación no debe realizarse a una temperatura superior a 70 °C.

La dosis terapéutica recomendada es de 5 mg de fenbendazol por kg de peso vivo.

Para asegurar la administración de la dosis correcta, debe determinarse el peso vivo de la manera más exacta posible.

Si se ha de tratar a los animales de manera colectiva en lugar de individualmente, se deben agrupar según su peso vivo para poder administrar la dosis adecuada y evitar así una infradosificación o una sobredosificación.

## TIEMPO DE ESPERA:

Carne: 6 días

## PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

Grupo farmacoterapéutico: antihelmínticos, derivados del benzimidazol - fenbendazol.  
Código ATCvet: QP52AC13.

## PERÍODO DE VALIDEZ:

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 años.

Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

Período de validez después de su incorporación en el alimento o pienso granulado: 1 mes.



KARIZOO

Laboratorios Karizoo, s.a.  
An Alivira Group Company

www.karizoo.com

Polig. Industrial La Borda  
Mas Pujades, 11-12  
08140 Caldes de Montbui  
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148  
F +34 938 654 648