

Karidox

100 mg/ml solución para administración en agua de bebida para pollos y cerdos
Doxiciclina



PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE
**ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS**



ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.

Karidox



100 mg/ml solución para administración en agua de bebida para pollos y cerdos
Doxiciclina

Doxiciclina en solución oral para el tratamiento de enfermedades respiratorias para cerdos y pollos de engorde



Pollos de engorde



Porcino

INDICACIONES

Prevención y tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica (CRD) y micoplasmosis producidas por los microorganismos sensibles a la doxiciclina.

Prevención de enfermedades del tracto respiratorio causadas por *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma hyopneumoniae* sensibles a la doxiciclina.

POSOLOGÍA

Administración por vía oral, en agua de bebida.

11,5 -23 mg de doxiciclina hclato/kg de peso vivo/día, equivalente a 0,1 - 0,2 ml del medicamento por kg de peso vivo, durante 3-5 días consecutivos.

11.5 mg de doxiciclina hclato/kg de peso vivo/día, equivalente a 0,1 ml del medicamento por kg de peso vivo, durante 5 días consecutivos.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 7 días

Huevos: Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano

Carne: 7 días

Karidox 100 mg/ml solución para administración en agua de bebida para pollos y cerdos. **Sustancia activa:** Doxiciclina 100 mg (equivalente a doxiciclina hclato 116,0 mg). **Especies de destino** Pollos (de engorde) y porcino. **Indicaciones de uso, especificando las especies de destino** Pollos (de engorde) Prevención y tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica (CRD) y micoplasmosis producidas por los microorganismos sensibles a la doxiciclina. Porcino Prevención de enfermedades del tracto respiratorio causadas por *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma hyopneumoniae* sensibles a la doxiciclina. Previamente al tratamiento, debe asegurarse la presencia de enfermedad en la manada. Posología y vía de administración: Administración por vía oral, en agua de bebida. Pollos (de engorde): 11,5 -23 mg de doxiciclina hclato/ Kg p.v./día, equivalente a 0,1 - 0,2 ml del medicamento / Kg p.v., durante 3-5 días consecutivos. Porcino: 11.5 mg de doxiciclina hclato/Kg p.v./día, equivalente a 0,1 ml del medicamento / Kg p.v., durante 5 días consecutivos. Se recomienda preparar una predisolución concentrada -con aproximadamente 100 g de medicamento por litro de agua de bebida- y diluirla hasta alcanzar las concentraciones terapéuticas en caso necesario. La solución concentrada se puede utilizar también con un dosificador proporcional de medicinas en agua de bebida. El agua medicada será la única fuente de bebida. El agua medicada restante deberá eliminarse de conformidad con las normativas locales. Si no se observa ninguna mejoría de los signos clínicos durante la duración del tratamiento, debe revisarse el diagnóstico y cambiarse el tratamiento. **Tiempo(s) de espera** Carne: Pollos (de engorde): 7 días Porcino: 7 días Huevos: Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. **Propiedades farmacológicas** Grupo farmacoterapéutico: Antibióticos. Tetraciclinas Código ATCvet: QJ01AA02 **Formatos:** Envasés de 1L y 5L. **Título de la autorización de comercialización** Laboratorios Karizoo, S.A. Polígono Industrial La Borda. Mas Pujades, 11-12 - 08140 - Caldes de Montbui (Barcelona) España. **Número de la autorización de comercialización** 1887 ESP. **Prohibición de venta, dispensación y/o uso** Condiciones de dispensación: **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.** Condiciones de administración: **Administración bajo control o supervisión veterinaria.**

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com



ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.