

Lincosol

400 mg/g polvo para administración en agua de bebida
Lincomicina



PARA SOLUCIONAR
PROBLEMAS
DIGESTIVOS



ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZO S.A.

Lincosol

400 mg/g polvo para administración en agua de bebida
Lincomicina

**CERO DÍAS
EN CARNE**

**Antibiótico
bacteriostático**

**Autorizado
su uso en cerdos
y pollos hasta el
sacrificio**

**Actividad
bactericida
frente algunos
microorganismos**

**En cerdos, se
recomienda usar
especialmente
durante los periodos
de transición y
engorde**

**Muy activo frente
a bacterias Gram+
y microorganismos
anaerobios**

**Presentación
en bolsas
termoselladas
de 1kg y 100g**



Indicaciones y dosis

Cerdos

Pollos

Bacterias	<i>Brachyspira hyodysenteriae</i>	<i>Clostridium perfringens</i>
Dosis	5-10 mg / kg de peso vivo / día	3-6 mg / kg de peso vivo / día
Días de tratamiento	5-10 días consecutivos	7 días consecutivos
Supresión	0 días	0 días
Presentación	1 kg / 100 g	1 kg / 100 g

Lincosol 400 mg/g polvo para administración en agua de bebida **Composición cualitativa y cuantitativa** Lincomicina (hidrocloruro) 400 mg. **Especies de destino** Porcino y aves (pollos de engorde). **Indicaciones de uso, especificando las especies de destino** Porcino: Para el tratamiento de la disentería porcina causada por cepas de *Brachyspira hyodysenteriae* sensibles a la lincomicina. Aves (pollos de engorde): Para el control de la enteritis necrótica causada por cepas de *Clostridium perfringens* sensibles a la lincomicina. **Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta** La lincomicina se excreta en leche, por lo que su uso no está recomendado durante la lactancia. **Posología y vía de administración** Administración en el agua de bebida. Porcino: un máximo de 10 días consecutivos (equivalente a 12,5 - 25mg de medicamento/kg p/día). Pollos: Administrar 3 - 6 mg por kg peso vivo y día durante 7 días consecutivos (equivalente a 7,5 - 15 mg de medicamento/kg p/día). Para asegurar una dosificación correcta, la concentración de lincomicina en el agua se ajustará teniendo en cuenta el consumo diario. Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una dosificación insuficiente. El agua debe ser renovada cada día. El agua medicada debe ser la única fuente de agua de bebida durante el periodo de tratamiento. **Tiempo(s) de espera** Porcino: - Carne: cero días Pollos de engorde: - Carne: cero días - Huevos: Su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. **Propiedades farmacológicas** Grupo farmacoterapéutico: Antibacteriano para uso sistémico. Código ATCvet: QJ01FF02. **Periodo de validez** Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 años. Periodo de validez después de abierto el empaque primario: 6 meses. Periodo de validez después de su disolución según las instrucciones: 24 horas. **Formato** Bolsas termoselladas de 100 g y 1 kg. **Titular de la autorización de comercialización** Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades, 11-12 08140 Caldes de Montbui (Barcelona) España **Número de la autorización de comercialización** 1929 ESP **prohibición de venta, dispensación y/o uso** Condiciones de dispensación: **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.** Condiciones de administración: **Administración bajo control o supervisión del veterinario.**

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com



ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.