


ToltraMAX

50 mg/ml suspensión oral para porcino
Toltrazurilo





MAX económico



MAX rápido



MAX eficaz



MAX IMIZA TU RENTABILIDAD





Toltra**MAX**

50 mg/ml suspensión oral para porcino
Toltrazurilo

1. Eficaz frente Coccidiosis
2. Fácil y cómodo de usar
3. Dosis única
4. Mejora el crecimiento

MAX **IMIZA TU RENTABILIDAD**

Toltramax 50 mg/ml suspensión oral para porcino. Composición por 1 ml: Toltrazurilo 50 mg. Especies de destino: Porcino (Lechones de 3 a 5 días de edad). Indicaciones: Para la prevención de los signos clínicos de la coccidiosis en lechones neonatales (de 3 a 5 días de edad) en granjas con una historia confirmada de coccidiosis causada por *Isospora suis*. Posología y vía de administración: Vía oral. Tratamiento animal individualizado. Cada lechón debe ser tratado a los 3-5 días de vida con una dosis única oral de 20 mg de toltrazurilo/kg de peso vivo, equivalente a 0,4 ml de suspensión oral por kg de peso vivo. La suspensión oral debe agitarse antes de su uso. Tiempo de espera: Carne: 77 días. Titular de la autorización de comercialización: Lavet Pharmaceuticals Ltd. Ottó u. 14., Budapest, H-1161. Hungría Reg. Núm.: 2.496 ESP

laboratorios
Karizoo



Laboratorios Karizoo s.a.
Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades 11-12
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 93 865 41 48, Fax 93 865 46 48
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com