


Amoxicilina 500 Karizoo

Polvo para administración en agua de bebida
Amoxicilina trihidrato

Para el tratamiento de procesos
infecciosos causados por
STREPTOCOCCUS SUIS



Para el tratamiento de
**PASTEURELLOSIS
Y COLIBACILOSIS**



PORCINO
6 DÍAS DE SUPRESIÓN



AVES
1 DÍA DE SUPRESIÓN

AMOXICILINA SOLUBLE CONCENTRADA PARA PORCINO Y AVES

ALTA SOLUBILIDAD EN AGUA
ALTA CONCENTRACIÓN



ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.

Amoxicilina 500 Karizoo

Polvo para administración en agua de bebida
Amoxicilina trihidrato

1

ANTIBIÓTICO BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO:

PORCINO

Para el tratamiento de procesos infecciosos causados por *Streptococcus suis*.

POLLOS, PAVOS Y PATOS DE ENGORDE

Para el tratamiento de pasteurellosis y colibacilosis, causados por cepas sensibles a la amoxicilina.

3

RAPIDEZ DE ACTUACIÓN

Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan entre 1-2 horas después de administrar el producto.

4

AMPLIO MARGEN DE SEGURIDAD

2

BUENA ABSORCIÓN GASTROINTESTINAL

5

BUENA DISTRIBUCIÓN EN LOS TEJIDOS

Baja unión a proteínas plasmáticas.

Producto	Amoxicilina 500 Karizoo			
Composición por g	Amoxicilina trihidrato 500 mg			
Presentación	400 g y 1 kg			
Especies				
	Porcino	Pollos de engorde	Patos de engorde	Pavos de engorde
Dosis	20 mg de amoxicilina/kg de peso vivo cada 24 horas durante 4 días.	15 mg de amoxicilina/kg de peso vivo cada 24 horas siendo la duración total del tratamiento de 5 días.	20 mg de amoxicilina/kg de peso vivo cada 24 horas durante 3 días.	15 a 20 mg de amoxicilina/kg de peso vivo cada 24 horas durante 5 días
Supresión	6 días	1 día	7 días	5 días

Amoxicilina Karizoo 500 mg/g. Polvo para administración en agua de bebida. **Composición cualitativa y cuantitativa:** Sustancia activa: Amoxicilina trihidrato, 500 mg (equivalente a 435,6 mg de amoxicilina base). **Forma farmacéutica:** Polvo para administración en agua de bebida. **Especies de destino:** Porcino Aves (pollos, pavos y patos, de engorde). **Indicaciones de uso, especificando las especies de destino:** Porcino: Para el tratamiento de procesos infecciosos causados por *Streptococcus suis*. Pollos, pavos y patos de engorde: Para el tratamiento de pasteurellosis y colibacilosis, causados por cepas sensibles a la amoxicilina. **Contraindicaciones:** No usar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas. **Advertencias especiales para cada especie de destino:** No está permitido su uso en aves ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano. No usar en las 4 semanas anteriores al comienzo del periodo de puesta ni durante la puesta. **Tiempo de espera:** Carne: Porcino: 6 días Pollos: 1 día Pavos: 5 días Patos: 7 días No está permitido su uso en aves ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano. **Propiedades farmacológicas:** Grupo farmacoterapéutico: Penicilinas de amplio espectro. Amoxicilina Código ATCvet: QJ01CA04. **Formatos:** Bolsa de 400 g y 1 kg. **Titular de la autorización de comercialización:** Laboratorios Karizoo, S.A. Polígono Industrial La Borda, C/ Mas Pujades, 11-12, 08140 Caldes de Montbui, Barcelona, España. **Número de la autorización de comercialización:** 1795 ESP. **Prohibición de venta, dispensación y/o uso** Condiciones de dispensación: Medicamento sujeto a prescripción veterinaria Condiciones de administración: Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@alivira.es
www.alivira.es



ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.