

# Rivalgin®

Metamizol sódico monohidratado 500 mg/ml

Solución inyectable



EFICAZ CONTRA  
**EL DOLOR  
Y LA FIEBRE**



ALIVIRA  
LABORATORIOS KAREDO S.A.

# Rivalgin®

Metamizol sódico monohidratado 500 mg/ml  
Solución inyectable

## Analgésico y antipirético



REDUCCIÓN  
DE LA FIEBRE



CONTROL DEL DOLOR  
POSTQUIRÚRGICO

Efectivo en el control del dolor post quirúrgico en perras sometidas a castración<sup>1</sup>



ALIVIO EFECTIVO  
DEL DOLOR



USO CON  
ANTIINFLAMATORIOS  
Y OPIOIDES

Permite la asociación con antiinflamatorios y opioides para el tratamiento multimodal del dolor.<sup>1,2,3</sup>



EFFECTO  
RÁPIDO Y POTENTE

### Referencias:

<sup>1</sup> Imagawa et al. (2011): The use of different doses of metamizol for post-operative analgesia in dogs.

<sup>2</sup> Guerrero et al. (2015): Comparison of a new metamizole formulation and carprofen for extended post-operative analgesia in dogs undergoing ovariohysterectomy

<sup>3</sup> Zanuzzo et al. (2015): Analgesic and antihyperalgesic effects of dipyrone, meloxicam or a dipyrone-meloxicam combination in bitches undergoing ovariohysterectomy.

**Rivalgin® 500 mg/ml** solución inyectable. **Composición cualitativa y cuantitativa:** cada 1 ml contiene: Sustancia activa: Metamizol monohidrato de sodio 500 mg. **Indicaciones:** Enfermedades de caballos, bovino, porcino y perros en las que se puede esperar un efecto positivo de los efectos analgésicos centrales, espasmolíticos, antipiréticos o antiinflamatorios leves. Alivio general del dolor para reducir el nerviosismo y las reacciones de defensa causadas por el dolor. Artritis aguda y crónica, estados reumáticos de los músculos y las articulaciones, inflamación de los nervios, neuralgia, tendovaginitis. **Contraindicaciones:** No usar en gatos. El medicamento veterinario no debe usarse en animales con trastornos hematopoyéticos. No administrar por vía subcutánea, ya que puede provocar irritación local. No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. **Posología y vía de administración:** Perros: Vía intravenosa lenta (en estados agudos) o vía intramuscular profunda. 50-20 mg de metamizol sódico monohidrato/kg de peso corporal (1-0,4 ml/10 kg de peso corporal). **Autorización de comercialización titular:** VetVita Richter GmbH, 4600 Wels, Austria. **Número de la autorización de comercialización:** 3815 ESP. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración exclusiva por el veterinario en caso de administración por vía intravenosa.**

Laboratorios Karizoo, s.a.  
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda  
Mas Pujades, 11-12  
08140 Caldes de Montbui  
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148  
F +34 938 654 648  
karizoo@alivira.es  
www.alivira.es



ALIVIRA  
LABORATORIOS KARIZOO S.A.