

# Rivalgin®

Metamizol sódico monohidrato 500 mg/ml

Ampliamente comprobado  
para la **reducción** del  
dolor y la fiebre



Potente analgésico  
y antipirético



Rivalgin®  
Solución Inyectable



KARIZOO



## **Rivalgin®: principio activo largamente utilizado en medicina veterinaria.**

Solución esencial para el alivio rápido del dolor y un fuerte efecto.

El metamizol es un potente analgésico no opioide que proporciona una analgesia profunda, además de los efectos periféricos de un antiflogístico. Sus propiedades espasmolíticas adicionales hacen de Rivalgin® un tratamiento valioso de afecciones espasmódicas como el cólico, así como de afecciones reumáticas tales como artritis aguda y crónica, tendovaginitis, neuritis y neuralgia.

En condiciones febriles, Rivalgin® conduce a una mejora rápida de la condición general al disminuir la temperatura corporal.

# Rivalgin®

Metamizol sódico monohidrato 500 mg/ml

Solución inyectable para bovinos, cerdos, equinos y perros.



✓ CORTO  
TIEMPO DE ESPERA

✓ REDUCCIÓN  
DE LA FIEBRE

✓ ALIVIO EFECTIVO  
DE DOLOR VISCERAL

✓ SE PUEDE  
REPETIR SU  
APLICACIÓN

✓ SÓLIDAMENTE  
ESTABLECIDO EN  
MEDICINA VETERINARIA

✓ AMPLIO GAMA  
DE INDICACIONES



✓ COJERA

Analgesia profunda en  
el tratamiento de cojera

✓ INICIO RÁPIDO -  
POTENTE EFECTO



LA SOLUCIÓN  
CORRECTA  
PARA PACIENTES  
DE ALTO RIESGO

Y en caso de contraindicaciones.  
para AINEs

# Rivalgin®

Metamizol sódico monohidrato 500 mg/ml



**Sustancia activa - concentración del fármaco:** Metamizol monohidrato de sodio 500 mg/ml (equivalente a metamizol 443,1 mg)

**Forma farmacéutica:** Solución inyectable

**Especies de destino:** Equinos, bovinos, cerdos y perros. 

**Ventajas del producto:**

- Inicio rápido - potente efecto.
- Sólidamente establecido en medicina veterinaria.
- Alivio efectivo del dolor visceral.
- Reducción de la fiebre y levemente antiespasmódico sin ralentizar el peristaltismo gastrointestinal.
- Se puede repetir su aplicación.
- La solución adecuada para pacientes de alto riesgo y en caso de contraindicaciones para los AINEs.
- Analgesia profunda en el tratamiento de la cojera.
- Amplia gama de indicaciones.
- Tiempos cortos de espera.
- Combinación con opioides y/o AINE.

**Indicaciones de uso:**

Enfermedades de equinos, bovino, porcino y perros en las que se puede esperar un efecto positivo de los efectos analgésicos centrales, espasmolíticos, antipiréticos o antiinflamatorios leves del medicamento veterinario, como por ejemplo:  
Alivio general del dolor para reducir el nerviosismo y las reacciones de defensa causadas por el dolor. Atenuación del dolor en cuadros de cólicos de diferente origen, o estados espásticos de los órganos internos en equinos y bovino. Oclusión del esófago con cuerpos extraños en equinos, bovino y porcino. Enfermedades febriles, como mastitis grave, síndrome de mastitis, metritis y agalactia, gripe porcina. Lumbalgia, tétanos (en combinación con antisuero contra el tétanos). Artritis aguda y crónica, estados reumáticos de los músculos y las articulaciones, inflamación de los nervios, neuralgia, tendovaginitis.

**Dosis:**

Especie	Vía	Metamizol sódico monohidrato	Rivalgin®
Equinos:	Vía intravenosa lenta	20-50 mg/kg	4-10 ml/100 kg
Bovinos:	Vía intravenosa lenta (en estados agudos) o vía intramuscular profunda	20-40 mg/kg	4-8 ml/100 kg
Cerdos:		15-50 mg/kg	3-10 ml/100 kg
Perros:		20-50 mg/kg	0,4-1ml/10 kg

**Tiempo de espera:**

**Equinos:** Carne (IV): 5 días  
**Bovino:** Carne: 12 días. / Leche: 48 horas  
**Porcino:** Carne: 12 días  
No usar en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

**Periodo de validez:**

Acondicionado para su venta: 30 meses. Después de abierto el envase primario: 28 días.

**Tamaño de embalaje:**

100 ml, 5 x 100 ml

Rivalgin 500 mg/ml solución inyectable. **Composición cualitativa y cuantitativa:** 1 ml contiene: **Sustancia activa:** Metamizol monohidrato de sodio 500 mg (equivalente a metamizol 443,1 mg). Excipientes: alcohol bencílico (E1519), agua para preparaciones inyectables. **Indicaciones de uso:** Enfermedades de equinos, bovino, porcino y perros en las que se puede esperar un efecto positivo de los efectos analgésicos centrales, espasmolíticos, antipiréticos o antiinflamatorios leves. Alivio general del dolor para reducir el nerviosismo y las reacciones de defensa causadas por el dolor. Atenuación del dolor en cuadros de cólicos de diferente origen, o estados espásticos de los órganos internos en equinos y bovino. Oclusión del esófago con cuerpos extraños en equinos, bovino y porcino. Enfermedades febriles, como mastitis grave, síndrome de mastitis, metritis y agalactia, gripe porcina. Lumbalgia, tétanos (en combinación con antisuero contra el tétanos). Artritis aguda y crónica, estados reumáticos de los músculos y las articulaciones, inflamación de los nervios, neuralgia, tendovaginitis. **Contraindicaciones:** No usar en gatos. El medicamento veterinario no debe usarse en animales con trastornos hematopoyéticos. No administrar por vía subcutánea, ya que puede provocar irritación local. No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. No usar en casos de insuficiencia cardíaca, hepática o renal, o de úlcera gastroduodenal. **Grupo farmacoterapéutico:** otros analgésicos y antipiréticos. **Código ATCvet:** código: QN02BB02. **Autorización de comercialización titular:** Richter Pharma AG, 4600 Wels, Austria. [www.richter-pharma.com](http://www.richter-pharma.com). Para más información sobre reacciones adversas, uso durante el embarazo, lactancia o postura, interacciones con otros medicamentos y precauciones especiales de uso, consulte el SPC específico del país. Prohibición de venta, suministro y / o uso: referir al SPC específico del país.

Laboratorios Karizoo, s.a.  
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda  
Mas Pujades, 11-12  
08140 Caldes de Montbui  
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148  
F +34 938 654 648  
[karizoo@karizoo.com](mailto:karizoo@karizoo.com)  
[www.karizoo.com](http://www.karizoo.com)



KARIZOO