

# Epityl

Comprimidos sabor  
para perros



## PRINCIPIO ACTIVO

Fenobarbital, 60 mg/comprimido

## ESPECIES DE DESTINO

Perros

## PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 100 comprimidos

Comprimidos divisibles en medios y/o cuartos iguales.

## INDICACIÓN

Prevención de convulsiones por epilepsia generalizada en perros.

## DOSIFICACIÓN

Inicialmente 2-5 mg de fenobarbital/kg/día; repartida en dos tomas iguales, preferiblemente con las comidas.

### Epityl 60 mg comprimidos sabor para perros.

**Principio activo:** Fenobarbital 60 mg/comprimido. **Especie destino:** perros. **Indicaciones:** prevención de convulsiones por epilepsia generalizada en perros. **Posología:** Inicialmente de 2 a 5 mg/kg/día repartido en 2 tomas iguales, preferible tomarlo con las comidas y todos los días a la misma hora. Las concentraciones séricas en estado de equilibrio no se alcanzan hasta 1-2 semanas después de haber iniciado el tratamiento. El efecto completo de la medicación no aparece hasta las dos semanas y no debe incrementarse las dosis durante este tiempo. No usar en caso de hipersensibilidad a los barbitúricos. No usar en animales con la función hepática gravemente deteriorada. No usar en animales con trastornos renales o cardiovasculares graves. No usar en perros de menos de 6 kg de peso corporal. **Titular de la comercialización:** Channell Pharmaceuticals Manufacturing Ltd Loughrea, Co. Galway, Irlanda N° registro: 2858 EP



# Diazedor

Suspensión inyectable  
para perros y gatos



## PRINCIPIO ACTIVO

Diazepam, 5 mg/ml

## ESPECIES DE DESTINO

Perros y gatos

## PRESENTACIÓN

10 viales de 2 ml



## INDICACIÓN

Tratamiento a corto plazo de trastornos convulsivos y espasmos musculoesqueléticos de origen central y periférico.

## DOSIFICACIÓN

Vía i.v. estricta. Tratamiento de trastornos convulsivos: 0,5mg/kg. (hasta tres bolos diferenciados 10 minutos entre uno y otro. Tratamiento de espasmos musculoesqueléticos: 0,5-2 mg/kg.

### Diazedor 5 mg/ml solución inyectable para perros y gatos

**Principio activo:** Diazepam 5mg/ml. **Especie destino:** perros y gatos. **Indicaciones:** Tratamiento a corto plazo de trastornos convulsivos y espasmos musculoesqueléticos de origen central y periférico. **Posología:** vía i.v. estricta. Tratamiento de trastornos convulsivos: 0,5mg/kg.(hasta tres bolos diferenciados 10 minutos entre uno y otro. Tratamiento de espasmos musculoesqueléticos: 0,5-2 mg/kg. **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en caso de hepatopatía grave. **Precauciones:** La administración intravenosa rápida puede causar hipotensión, trastornos cardíacos y tromboflebitis. En casos raros, principalmente en razas pequeñas de perros, pueden observarse reacciones paradójicas (como excitación, agresividad, efecto desinhibidor, etc.), por lo que debe evitarse el uso de diazepam en monoterapia en animales potencialmente agresivos. **Presentación:** caja conteniendo 10 ampollas. N° registro 3643ESP Producto de prescripción veterinaria Administración única por el veterinario. **Titular de la comercialización:** Richter pharma AG 4600Wells Austria.