

ANTIBIÓTICOS KARIZOO

QUINOLONAS



Marbofloxoral

20 y 80 mg comprimidos para Perros

Marbofloxacinó

- **Principio activo:** Marbofloxacinó 20 y 80 mg
 - **Especies de destino:** Perros
 - **Presentaciones:** Marbofloxoral 20 mg: 100 comprimidos
Marbofloxoral 80 mg: 100 comprimidos
- COMPRIMIDOS FRACCIONABLES EN 2 ó 4 PARTES

Marbofloxoral 20 y 80 mg. Comprimidos para perros. Principio activo: Marbofloxacinó **Especies de destino:** perros **Indicaciones:** Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles al marbofloxacinó en Pioderma superficial o profunda, infecciones del tracto urinario asociadas o no a prostatitis y/o epididimitis e infecciones respiratorias. **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en perros de razas grandes de menos de 12 meses de edad. No usar en animales epilépticos ante la ausencia de datos en estos casos. **Posología y vía de administración:** vía oral 2 mg/kg. **Titular de la autorización de la comercialización:** Fatro Ibérica S.L. C/ Constitución 1, Planta baja 3 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) **Nº registro** Marbofloxoral 20 mg: 2724ESP, Marbofloxoral 80 mg: 2725ESP

ENROtab

50 y 150 mg. Comprimidos para perros

Enrofloxacinó



- **Enrofloxacinó 50 y 150 mg**
- **Especies de destino:** Perros
- **Presentaciones:** ENROtab 50 mg: 100 comprimidos
ENROtab 150 mg: 100 comprimidos

Enrotab 50 y 150 mg. Comprimidos para perros. Principio activo: Enrofloxacinó. **Especies de destino:** perros. **Indicaciones:** Tratamiento de infecciones de vías urinarias inferiores (asociado o no con prostatitis) e infecciones de vías urinarias superiores causadas por *Escherichia coli* o *Proteus mirabilis*. Tratamiento de pioderma superficial y profunda. **Contraindicaciones:** No usar en cachorros o en perros en crecimiento (perros de menos de 12 meses en razas pequeñas o de menos de 18 meses en razas grandes). No administrar a perros que tengan desórdenes nerviosos. No usar en perros en caso de hipersensibilidad conocida a las fluoroquinolonas o a algún excipiente del medicamento veterinario. No utilizar en caso de resistencia a las quinolonas, ya que puede existir resistencia cruzada casi completa con otras quinolonas y resistencia cruzada completa con otras fluoroquinolonas. No usar junto a tetraciclinas, fencólicos o macrólidos debido a efectos antagónicos potenciales. **Posología y vía de administración:** vía oral, 5mg/kg/día. **Titular de la autorización de comercialización:** CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Oststrandring 13 31303 Burgdorf Alemania 8. **Nº registro:** 2215ESP y 2216ESP



KARIZOO

ANTIBIÓTICOS KARIZOO

BETALACTÁMICOS

Noroclav

Comprimidos para perros y gatos 50, 250 y 500 mg

Amoxicilina y Ácido Clavulánico

- **Principio activo:** Amoxicilina y Ácido Clavulánico
- **Especies de destino:** Perros y gatos
- **Presentaciones:**

Noroclav 50 mg: Envases con 20, 100 y 500 comprimidos

Noroclav 250 mg: Envases con 20, 50 y 250 comprimidos

Noroclav 500 mg: Envases con 25 y 100 comprimidos

Noroclav Comprimidos: Principio activo: Amoxicilina y Ac. Clavulánico 50, 250 y 500 mg. Especies de destino: perros y gatos. Indicaciones: Tratamiento de infecciones respiratorias, de piel, tracto urinario y tejidos blandos, provocadas por cepas productoras de betalactamasas y sensibles a la combinación Amoxicilina y Ácido Clavulánico. Posología: 12,5 mg/kg dos veces al día. No usar en animales hipersensibles a las penicilinas u otros betalactámicos. No usar en conejos, jerbos, cobayas. N° Registro: 1571ESP, 1572ESP, 1801ESP. Titular de la autorización de comercialización: Norbrook Laboratories Ltd, Station Works, Newry, BT35 6JP, Co. Down, Irlanda del Norte.

Noroclav

175 mg Suspensión Inyectable

Amoxicilina y Ac. Clavulánico

- **Principio activo:** Amoxicilina y Ac. Clavulánico
- **Especies de destino:** Perro
- **Presentaciones:** Envase multidosis de 50 ml

NO NECESITA REFRIGERACIÓN

ALTA JERINGABILIDAD



Noroclav Inyectable: Principio activo: Amoxicilina y Ac. Clavulánico 175 mg. Especies de destino: perros. Indicaciones: Tratamiento de infecciones respiratorias, de piel, tracto urinario y tejidos blandos, provocadas por cepas productoras de betalactamasas y sensibles a la combinación Amoxicilina y Ácido Clavulánico. Posología: 8,75 mg/kg una vez al día. No usar en animales hipersensibles a las penicilinas u otros betalactámicos. No usar en conejos, jerbos, cobayas. Utilizar siempre jeringa y aguja seca. N° Registro: 1582 ESP. Titular de la autorización de comercialización: Norbrook Laboratories Ltd, Station Works, Newry, BT35 6JP, Co. Down, Irlanda del Norte.

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com



KARIZOO