

Ketamidor[®]

100 mg/ml Solución Inyectable

Un clásico de actualidad

- *Ketamina 100 mg/ml*
- *Especies de destino: perros, gatos, equino, bovino y porcino*
- *Presentaciones: 10 ml y 50 ml*





La ketamina no debe usarse como un mono-anestésico en perros, ya que causa un aumento del tono muscular y contracciones musculares incoordinadas.

PERROS

Para la inducción de la anestesia

Medetomidina (1 mg/ml)

40 µg/kg (0,04 ml/kg)

IM

Seguido de

Ketamidor®

0,5-0,75 ml/10 kg (5-7,5 mg/kg)

IM

La duración del efecto varía entre 30 – 50 minutos y está relacionada con la dosis

Xilacina 2%

2 mg/kg (0,1 ml/kg)

IM

Después de
10 minutos

Ketamidor®

1 ml/10kg (10 mg/kg)

IM

En perros de más de 25 kg de peso corporal reducir la dosis de xilacina a 1,3 mg/kg.

El inicio de la acción es normalmente a los 10 minutos y la duración del efecto es de aproximadamente 30 minutos



Es posible el uso de ketamina como mono-anestésico, pero para evitar efectos psicomotores indeseados se recomienda la anestesia combinada.

GATOS

Como agente único

Ketamidor® para inmovilización menor

0,11 ml/kg (11 mg/kg)

IM

Ketamidor® para cirugía menor e inmovilización de gatos irritable

0,22-0,33 ml/kg (22-33 mg/kg)

IM

El inicio de la acción es normalmente a los 5 minutos de la administración de ketamina y la duración del efecto es de aproximadamente 30 – 45 minutos.

Para la inducción de la anestesia (anestesia < 1 hora)

Para la inducción de la anestesia

Medetomidina (1 mg/ml)

80 µg/kg (0,4 ml/5 kg)

IM

Seguido de

Ketamidor®

0,25-0,4 ml/5 kg (5-7,5 mg/kg)

IM

El inicio de la acción es normalmente a los 3 – 4 minutos y la duración del efecto varía entre 30 – 60 minutos y está relacionada con la dosis.

Xilacina 2%

1-2 mg/kg (0,25-0,5 ml/5 kg)

IM,SC

y

Ketamidor®

0,15-1 ml/5 kg (10-20 mg/kg)

IM,SC

Si se usa la dosis más alta de ketamina (20 mg/kg), debe usarse la dosis más baja de xilacina (1 mg/kg). El inicio de la acción es normalmente a los 5 minutos de la administración de ketamina y la duración del efecto es de al menos 30 minutos.

Ketamidor 100 mg/ml Solución Inyectable. Cada ml contiene 100 mg de ketamina (hidrocloruro). Especies de destino: perros, gatos, equino, bovino y porcino. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en animales con descompensación cardíaca severa, hipertensión arterial aparente, traumatismo cerebrovascular y trastornos de la función hepática y renal. No usar en casos de eclampsia, preeclampsia, glaucoma y trastornos convulsivos (p.e. epilepsia). No se recomienda para intervención quirúrgica en la faringe, la laringe, la tráquea o el árbol bronquial. Para más información consultar S.P.O. Titular de la comercialización: Richter Pharma AG Feldgasse 19 4600 Wels, Austria NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 2695 ESP Medicamento de uso veterinario sujeto a prescripción veterinaria. Uso exclusivo por el veterinario.



laboratorios
Karizoo



Laboratorios Karizoo s.a.
Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona

Tel. 93 865 41 48
Fax 93 865 46 48
pets@karizoo.com
www.karizoo.com