

Karidiet Pro

Pienso complementario dietético



**ESTABILIZADOR
DEL EQUILIBRIO HÍDRICO
Y ELECTROLÍTICO
PARA APOYAR LA
DIGESTIÓN FISIOLÓGICA**



KARIZOO

Karidiet Pro

Pienso complementario dietético



Prevención y tratamiento de los trastornos digestivos (diarrea) y en su convalecencia.

- Administrar 3 tomas en intervalos de 12 horas.
- Suministrar después de los primeros signos de diarrea, hasta que los síntomas hayan desaparecido.
- El tiempo entre preparación y la toma, debe ser **inmediato** (preparar delante del animal a tratar), antes de que la **solución gelifique**.
- Se recomienda dar las dos primeras tomas con agua y la tercera con leche o lactoreemplazante.
- El animal debe tener siempre agua limpia a disposición.

Composición

Dextrosa, *Plantago ovata*, Paredes celulares de levadura inactiva (*Saccharomyces cerevisiae*), Bicarbonato sódico (7%), Citrato potásico (5%) Cloruro de sodio, Lactosa. Fuentes de hidratos de carbono: Dextrosa y lactosa.

Plantago ovata se utiliza como laxante formador de volumen por las propiedades higroscópicas de su cutícula. También se conoce con los nombres vulgares de Ispaghula, o Psyllium.

Los mucílagos de la Ispaghula actúan como reguladores del peristaltismo intestinal. En caso de diarrea, pueden adsorber el exceso de agua de la luz intestinal debido a su elevado poder higroscópico.

Es efectivo frente a la diarrea producida por bacterias o virus por ej: en terneros de menos de 1 semana, causada por bacterias como la *E coli*. También frente a las diarreas en los terneros de 1 a 3 semanas de edad causada por virus y criptosporidios.

En intoxicaciones alimentarias actúa como depurador intestinal arrastrando con el bolo fecal las toxinas.

Especies de destino

Terneros, corderos, cabritos y potros.

Instrucciones de uso

Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización.

Complemento nutricional que contiene electrolitos, hidratos de carbono y *Plantago ovata* para la prevención y tratamiento de trastornos digestivos (diarrea), pudiéndose utilizar con agua y/o leche (lactoreemplazante) durante la convalecencia.

Regula el tránsito intestinal y asegura una alimentación hídrica y energética durante períodos breves (36 a 48 horas).

No utilizar conjuntamente con fármacos antiespasmódicos, ni otras soluciones electrolíticas, salvo INDICACIÓN veterinaria.

Vía de administración

Vía oral, disuelto en agua y/o leche (lactoreemplazante) templada a 40°C

Dosificación

Administrar 3 tomas con un intervalo de 12 h con el producto disuelto en agua y/o leche (lactoreemplazante) a 40°C.

Mezclar y dar al animal inmediatamente antes que la solución gelifique.

▪ Terneros y Potros:

100 g diluidos en 2 L máximo por toma.

▪ Corderos y Cabritos:

25 g diluidos en 500 ml máximo por toma.

EL TIEMPO ENTRE PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEBE SER INMEDIATO (PREPARAR DELANTE DEL ANIMAL A TRATAR)

Período de utilización recomendado

De 1 a 7 días (de 1 a 3 días si constituye el alimento exclusivo del animal).

Tiempo de espera

No precisa.

Presentación

Envase de 1 Kg con dosificador de 25 g (dosificador enrasado).