

Kabergovet®

Solución oral para perros y gatos
Cabergolina



PRINCIPIO ACTIVO

Cabergolina 50 µg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Perras y gatas.

PRESENTACIÓN

Frascos conteniendo 7 o 15 ml. Acompañados por una jeringa de 3 ml.

INDICACIÓN

Tratamiento de la pseudogestación en perras y supresión de la lactación en perras y gatas.

DOSIFICACIÓN

Vía oral solo o con comida. 0,1 ml/kg (5 µg/kg).

Una vez al día durante 4-6 días.

Kabergovet® 50 microgramos/ml. Solución oral para perros y gatos. Principio activo: Cabergolina 50 µg/ml. Especies de destino: Perras y gatas. **Uso:** Pseudogestación en perras y supresión de la lactación en perras y gatas. No usar en hembras gestantes ya que puede provocar un aborto. No usar con antagonistas dopaminérgicos. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.** **Vía de administración:** Oral, solo o junto a comida, nunca con líquidos. **Dosificación:** 0,1 ml/kg p.v. equivalente a 5 µg/kg, una vez al día durante 4-6 días. **Presentación:** frasco conteniendo 7 ó 15 ml y una jeringa de 3ml. **Nº registro:** 3968 ESP Titular de la comercialización: Vet-Agro Multi-Trade Company Sp.z o.o. Gliniana,32, 20-616 Lublin Polonia. **Distribuido por:** Laboratorios Karizoo Pol. Ind. La Borda 08140 Caldes de Montbui



Uristop®

Jarabe para perros
Hidrocloruro de
fenilpropanolamina



PRINCIPIO ACTIVO

Fenilpropanolamina 40,28 mg.

ESPECIES DE DESTINO

Perros.



PRESENTACIÓN

Frascos multidosis de 50 ml. Con jeringa dosificadora.

INDICACIÓN

Tratamiento de la incontinencia urinaria asociada a la insuficiencia del esfínter uretral en perras ovariectomizadas.

DOSIFICACIÓN

0,1 ml/5 kg p.v. (1mg/kg).

Tres veces al día, con las comidas

Uristop 40 mg/ml Jarabe. Composición: 1 ml contiene 40,28 mg de fenilpropanolamina equivalente a 50 mg de hidrocloreto de fenilpropanolamina. **Especies de destino:** perros. **Indicaciones:** Tratamiento de la incontinencia urinaria asociada a la insuficiencia del esfínter uretral en la perra. **Contraindicaciones:** No usar para tratar problemas de micción asociados al comportamiento. No usar en animales tratados con inhibidores no selectivos de la monoamino oxidasa. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. **Posología:** 1 mg de fenilpropanolamina/kg p.v. 3 veces al día en la comida (equivalente a 0,1 ml/5 kg p.v. 3 veces al día). La absorción del fármaco aumenta cuando se administra en ayunas. **Presentación:** Frasco conteniendo 50 ml. **Titular autorización de la comercialización:** Laboratorios Karizoo. **Reg. Núm.:** 2993-ESP. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administrar bajo control o supervisión veterinaria.**