

Uristop[®]

40 mg/ml

Jarabe para perros

PRINCIPIO ACTIVO

Fenilpropanolamina.

ESPECIES DE DESTINO

Perros.

INDICACIÓN

Tratamiento de la incontinencia urinaria asociada a la insuficiencia del esfínter uretral en perras ovariectomizadas.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

La dosis recomendada es de 1mg/kg, equivalente a 0,1 ml/5 kg de Uristop. Administrar tres veces al día con las comidas.

PRESENTACIÓN

Envase multidosis de 50 ml acompañado de una jeringa dosificadora.



Uristop[®] 40 mg/ml Jarabe. Composición: 1 ml contiene 40,28 mg de fenilpropanolamina equivalente a 50 mg de hidrocloreuro de fenilpropanolamina. **Especies de destino:** perros. **Indicaciones:** Tratamiento de la incontinencia urinaria asociada a la insuficiencia del esfínter uretral en la perra. **Contraindicaciones:** No usar para tratar problemas de micción asociados al comportamiento. No usar en animales tratados con inhibidores no selectivos de la monoamino oxidasa. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. **Posología:** 1 mg de fenilpropanolamina/kg p.v., 3 veces al día en la comida (equivalente a 0,1 ml/5 kg p.v., 3 veces al día). La absorción del fármaco aumenta cuando se administra en ayunas. **Presentación:** Frasco conteniendo 50 ml. **Titular autorización de la comercialización:** Laboratorios Karizoo. **Reg. Núm:** 2993-ESP. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administrar bajo control o supervisión veterinaria.**



Caniphedrin®

20 y 50 mg
Comprimidos para perros



PRINCIPIO ACTIVO

Hidrocloruro de efedrina.

ESPECIES DE DESTINO

Perros.

INDICACIÓN

Tratamiento de la incontinencia urinaria asociada a la insuficiencia del esfínter uretral en perras ovariectomizadas.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

La dosis inicial recomendada es de 2 mg/kg durante los primeros 10 días de tratamiento. Una vez logrado el efecto deseado, la dosis puede reducirse a la mitad o más, con el objetivo de encontrar la dosis mínima eficaz para el tratamiento a largo plazo.

PRESENTACIÓN

Caniphedrin 20 mg: envase conteniendo 100 comprimidos divisibles en 2 y/o 4 partes.

Caniphedrin 50 mg: envase conteniendo 100 comprimidos divisibles en 2 partes.

Caniphedrin® comprimidos para perros 20 y 50 mg: Principio activo: hidrocloreuro de efedrina 20 y 50 mg. **Especie de destino:** perros **Indicaciones:** Tratamiento de la incontinencia urinaria causada por la incompetencia del mecanismo del esfínter uretral en perras ovariectomizadas. **Contraindicaciones:** No usar en perros con enfermedad cardiovascular (miocardiopatía, taquiarritmia, hipertensión), hipertiroidismo, diabetes mellitus, insuficiencia renal o glaucoma. No usar de manera concomitante con narcóticos halogenados como halotano o metoxilurano. No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. **Posología:** 2 mg de hidrocloreuro de efedrina por kg de peso corporal al día durante los primeros 10 días del tratamiento. La dosis diaria puede dividirse. Cuando se haya conseguido el efecto deseado, la dosis se puede reducir a la mitad La dosis mínima eficaz se debe mantener en el tratamiento a largo plazo. **Presentación:** envases conteniendo 100 comprimidos. **Titular de la autorización de comercialización:** VetViva Richter GmbH, Dürnsolstrasse 14, 4600 Wels, Austria **Registro nº:** 3926 ESP y 3927 ESP **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administrar bajo control o supervisión veterinaria.**