

Synchronate®

Cloprostenol 250 microgramos/ml



**TRATA LAS
ALTERACIONES
DEL CICLO**
en vacas y yeguas

**INDUCE
O SINCRONIZA
EL PARTO**
en vacas y cerdas

**REGULA LA
FUNCIÓN DEL
CUERPO LÚTEO**
Análogo de PGF2 α



LA LUTEÓLISIS MÁS POTENTE




ALIVIRA
LABORATORIOS KAREDO S.A.

Beneficios de elegir



Synchronate®

Cloprostenol 250 microgramos/ml



Vida media más larga

Más resistente
al metabolismo endógeno

Mayor potencia

Mayor pureza
de la molécula

Isómero más activo

**CLOPROSTENOL
SÓDICO^{1,2,3}**



PORCINO (cerdas)



BOVINO (vacas)



CABALLOS (yeguas)

Concentración	Cloprostenol 250 microgramos/ml (263 microgramos de cloprostenol sódico)		
Indicaciones de uso	Inducción del parto uno o dos días antes de la fecha estimada de parto.	- Inducción y sincronización del estro en vacas y novillas con cuerpo lúteo funcional. - Inducción del estro como ayuda para el manejo del subestro ("celo silencioso"). - Tratamiento de la endometritis clínica y subclínica en presencia de un cuerpo lúteo funcional. - Tratamiento de los quistes lúteos ováricos. - Inducción del parto después del día 270 de gestación. - Inducción del aborto hasta el día 150 de gestación.	- Inducción y sincronización del estro en yeguas con cuerpo lúteo funcional. - Interrupción de la gestación temprana entre el día 5 y el día 120 de gestación.
Vía de administración	Vía intramuscular		
Dosificación	Dosis única de 0,7 ml/animal	Dosis única de 2,0 ml/animal	Dosis única de 0,5 - 2 ml/animal
Tiempos de espera	Carne: 1 día	Carne: 1 día Leche: 0 días	Carne: 2 días Leche: 24 horas

FICHA TÉCNICA



Referencias:

1. Martins et al., 2011
2. Montaser & El-Desouky, 2016
3. Pursley et al., 2012

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
karizoo@alivira.es
www.alivira.es



ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.