

Kabergovet®

Solución oral para perros y gatos
Cabergolina



PRINCIPIO ACTIVO

Cabergolina 50 µg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Perros y gatos.

PRESENTACIÓN

Frascos conteniendo 7 o 15 ml.
Acompañado de una jeringa dosificadora.

INDICACIÓN

Tratamiento de la pseudogestación en perras y supresión de la lactación en perras y gatas.

DOSIFICACIÓN

Vía oral solo o con comida. 0,1 ml/kg (5 µg/kg).
Una vez al día durante 4-6 días.

Kabergovet® 50 microgramos/ml. Solución oral para perros y gatos. Principio activo: Cabergolina 50 µg/ml. **Especies de destino:** Perros y gatos. **Uso:** Pseudogestación en perras y supresión de la lactación en perras y gatas. No usar en hembras gestantes ya que puede provocar un aborto. No usar con antagonistas dopaminérgicos. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. **Vía de administración:** Oral, solo o junto a comida, nunca con líquidos. **Dosificación:** 0,1 ml/kg p.v. equivalente a 5 µg/kg, una vez al día durante 4-6 días. **Presentación:** frasco conteniendo 7 ó 15 ml y una jeringa de 3ml. **Nº autorización:** 3968 ESP. **Titular de la comercialización:** Vet-Agro Multi-Trade Company Sp.z o.o. Gliniana,32. 20-616 Lublin Polonia. **Distribuido por:** Laboratorios Karizoo Pol. Ind. La Borda 08140 Caldes de Montbui. **Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**

Thyroxavet®

Comprimidos para perros y gatos
Levotiroxina sódica



PRINCIPIO ACTIVO

Levotiroxina sódica 200,400 y 800 µg.

ESPECIES DE DESTINO

Perros y gatos.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 250 comprimidos altamente palatables y divisibles en 2 y 4 partes.

INDICACIÓN

Tratamiento del hipotiroidismo primario y secundario en perros y gatos.

DOSIFICACIÓN

Dosis inicial recomendada 20 µg/kg/día en una sola toma o repartida en 2 tomas iguales. La dosis debe ajustarse dependiendo de la respuesta clínica y de los niveles de tiroxina plasmática.

Thyroxavet comprimidos para perros y gatos. Principio activo: Levotiroxina sódica 200,400 y 800 µg. **Especies de destino:** Perros y gatos. **Indicaciones:** Tratamiento del hipotiroidismo primario y secundario. **Posología:** Dosis inicial 20 µg/kg/día. **Contraindicaciones:** No usar en animales con insuficiencia suprarrenal no corregida. No usar en animales con sensibilidad conocida a la levotiroxina o algún excipiente. **Presentación:** Envases conteniendo 250 comprimidos altamente palatables y divisibles en 2 y 4 partes. **Titular de la comercialización:** Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. Z o. o., Gliniana 32, 20-616 Lublin Polonia. **Nº autorización comercialización:** 4038/4039/4040ESP. **Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@alivira.es
www.alivira.es



ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.