



La dosificación precisa que aporta calidad de vida

Pergoquin®

Pergolida 1 mg
Comprimidos para caballos



Pergoquin: tratamiento sintomático de la Disfunción de la Parte Intermedia de la Pituitaria (PPID) en caballos.

PPID, también conocida como Enfermedad de Cushing Equina

- ✓ Una de las enfermedades endocrinas más comunes en equinos.
- ✓ Afecta aproximadamente al 30% de los caballos con más de 15 años.^{1,2}
- ✓ Hiperplasia o adenoma de la parte intermedia de la glándula pituitaria:
 - Desajuste en el control de los neurotransmisores dopaminérgicos.¹
 - Aumento de los niveles plasmáticos de ACTH.¹
- ✓ Signos clínicos: hipertricotosis, laminitis, hiperhidrosis, poliuria/polidipsia, desregulación de la insulina, letargia, atrofia muscular y disfunción vascular.¹

Pergolida, tratamiento sintomático de la PPID

- ✓ Tratamiento de elección frente a la PPID.²
- ✓ Suprime la actividad de la parte intermedia reduciendo los niveles plasmáticos de ACTH y mejorando los signos clínicos.²



Bibliografía:

1. Morgan et al. (2018): Dysregulation of Cortisol Metabolism in Equine Pituitary Pars Intermedia Dysfunction.
2. Donaldson et al. (2002): Treatment with Pergolide or Cyproheptadine of Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (Equine Cushing's Disease).
3. Rendle et al. (2019): Pharmacokinetics and pharmacodynamics of pergolide mesylate after oral administration in horses with pituitary pars intermedia dysfunction.



✓ **Comprimidos divisibles en 2 o 4 partes iguales.**
Dosificación precisa y fácil.

✓ **Ideal para ponis
y caballos pequeños.**

✓ **Reducción de la
concentración plasmática
de ACTH 12 horas después
de la administración oral.³**

✓ **Amplio perfil de seguridad.**

✓ **Excelente concentración:**
1 mg por día para un caballo
estándar de 500 kg.

✓ **3 días:** estabilidad
del comprimido dividido.

✓ **Práctico envases
de 60 o 200 comprimidos.**

✓ **Administración oral
una vez al día.**

Pergoquin®

Pergolida 1 mg

La dosificación precisa
que aporta calidad de vida



Principio activo: Pergolida 1 mg.

Presentación farmacéutica: Comprimidos.

Especies destino: Caballos.

Dosificación: Vía oral, una vez al día.

La dosis de inicio es de 2 µg de pergolida/kg peso corporal (rango de dosis: 1,7 a 2,5 µg/kg). Los estudios de la bibliografía publicada citan como la dosis promedio más habitual 2 µg de pergolida/kg, con un rango de 0,6 a 10 µg de pergolida/kg. La dosis inicial (2 µg de pergolida/kg, p. ej. un comprimido para 500 kg de peso corporal) se debe determinar según la respuesta observada en cada caso (consulte la tabla de dosis). Para facilitar la administración, el comprimido puede disolverse en agua y/o mezclarse con melaza u otros edulcorantes.

Peso vivo del caballo	Número comprimidos	Dosis inicial	Rango de dosis
200 – 300 kg	1/2	0,50 mg	1,7 – 2,5 µg/kg
301 – 400 kg	3/4	0,75 mg	1,9 – 2,5 µg/kg
401 – 600 kg	1	1,00 mg	1,7 – 2,5 µg/kg
601 – 850 kg	1 1/2	1,50 mg	1,8 – 2,5 µg/kg
851 – 1000 kg	2	2,00 mg	2,0 – 2,4 µg/kg

Tiempo de espera: No autorizado para uso en caballos destinados al consumo humano. Los caballos tratados no deberán sacrificarse para el consumo humano. El caballo debe haber sido declarado como no destinado al consumo humano conforme la legislación nacional para el pasaporte equino. Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Período de validez: Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 años
Período de validez de los comprimidos divididos después de abierto el envase primario: 3 días.

Envases: 60 comprimidos y 200 comprimidos.

Ficha técnica: Pergoquin 1 mg comprimidos para caballos. **Composición cualitativa y cuantitativa:** Cada comprimido contiene: Pergolida 1,0 mg equivalente a 1,31 mg de mesilato de pergolida. **Indicaciones:** Tratamiento sintomático de los signos clínicos asociados a la Disfunción de la Parte Intermedia de la Pituitaria (PPID) (Enfermedad de Cushing Equina). **Contraindicaciones:** No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo o a otros derivados del cornezuelo del centeno o a alguno de los excipientes. No usar en caballos menores de 2 años. **Número de la autorización de comercialización:** 4230 ESP. **Titular de la autorización de comercialización:** VetViva Richter GmbH 4600 Wels, Austria. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria**

