

Vimectanin Duo

50 mg/ml + 1 mg/ml Suspensión oral para ovino
Triclabendazol / Ivermectina

La combinación ganadora

Triclabendazol

Acción frente a
Fasciola hepatica
en todos sus estadios

Ivermectina

Amplio espectro
de acción frente a
nematodos gastrointestinales
y pulmonares



ALIVIRA
LABORATORIOS KAREZOO S.A.

Vimectanin Duo

50 mg/ml + 1 mg/ml Suspensión oral para ovino
Triclabendazol / Ivermectina

Actúa contra todos los estadios de *Fasciola hepatica* y los nematodos gastrointestinales y pulmonares de mayor relevancia en ovino.



Práctico

Un solo producto oral para tratar los principales parásitos que afectan al ganado ovino.¹



Eficacia única contra *Fasciola hepatica*

El triclabendazol es el único activo que actúa en todas las fases del parásito.^{2,3}



Amplio espectro de acción

La ivermectina controla nematodos gastrointestinales, pulmonares y ectoparásitos.^{1,2}



Mejora la productividad

Reduce pérdidas debidas a cuadros subclínicos o clínicos, optimizando la ganancia de peso y la salud global del rebaño.



Tiempo de espera en carne:
27 días



Tabla de dosificación: 2 ml/10 kg de peso vivo

Peso del animal	Dosis de Vimectanin Duo
20 – 25 kg	5 ml
26 – 30 kg	6 ml
31 – 35 kg	7 ml
36 – 40 kg	8 ml
41 – 50 kg	10 ml
51 – 60 kg	12 ml
61 – 70 kg	14 ml
71 – 80 kg	16 ml
81 – 90 kg	18 ml
91 – 100 kg	20 ml

Bibliografía:

1. Stevenson CR et al. The efficacy of formulations of triclabendazole and ivermectin in combination against liver fluke (*Fasciola hepatica*) and gastro-intestinal nematodes in cattle and sheep and sucking lice species in cattle. Aust Vet J 2002 Nov; 80(11):698-701.
2. Kahl A et al. Efficacy of flukicides against *Fasciola hepatica* and first report of triclabendazole resistance on German sheep farms. International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance 23 (2023) 94-105.
3. Merachew W, Alemneh T, Debelu M (2020) Evaluation of the Efficacy of Triclabendazole in Naturally Infected Sheep with *Fasciola* species at Bonga Sheep Breeding and Improvement Center, South West Ethiopia. Int J Vet Sci Res 6(2): 178-183.



Vimectanin Duo 50 mg/ml + 1 mg/ml suspensión oral para ovino. **Composición:** Cada ml contiene: Triclabendazol 50,0 mg, Ivermectina 1,0 mg. **Especies de destino:** Ovino (de al menos 3 meses). **Indicaciones de uso:** Tratamiento de las infecciones simultáneas por trematodos y nematodos (gusanos gastrointestinales, gusanos pulmonares) o por trematodos y artrópodos en los siguientes casos: Nematodos gastrointestinales (adultos e inmaduros): *Haemonchus contortus*, *Teladorsagia (Ostertagia) circumcincta*, *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp. incluido *N. battus*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum* spp. y *Chabertia ovina* adulta. Trematodos hepáticos (estadios maduros, inmaduros e inmaduros tempranos hasta menos de 1 semana de edad): *Fasciola hepatica*. Gusanos pulmonares (adultos e inmaduros): *Dictyocaulus filaria*. Reznos nasales (todos los estadios): *Oestrus ovis*. **Posología y vía de administración:** Vía oral. La dosis recomendada es de 0,2 mg de ivermectina y 10 mg de triclabendazol/kg de peso vivo, equivalente a 2 ml de medicamento veterinario por 10 kg de peso vivo. Una dosis insuficiente podría resultar ineficaz y favorecer el desarrollo de resistencias. Para garantizar una dosificación correcta, debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible. **Tiempo de espera:** Carne: 27 días. Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano, incluso durante el período seco. No utilizar en el plazo de 1 año antes del primer parto en ovejas destinadas a producir leche para consumo humano. **Titular de la autorización de comercialización:** Pharma Vim. **Nº de Autorización:** 4368 ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.