

Emevet®

16 mg / 24 mg / 60 mg / 160 mg
Comprimidos masticables para perros
Maropitant

¡Buen Viaje!



Mejor
sin náuseas



ALIVIRA

Emevet®

16 mg / 24 mg / 60 mg / 160 mg

Comprimidos masticables para perros

Maropitant

Mecanismo de acción del maropitant



Antagonista del receptor de neuroquinina-1 (NK1).



Bloquea la unión de la sustancia P a los receptores NK1 en el centro del vómito.



Suprime la emesis mediada de forma central (por mareo por movimiento o apomorfina) **y periférica** (gastroenteritis o quimioterapia).



Inhibe la transmisión de señales que desencadenan el vómito.

Indicaciones

Prevención de las **náuseas causadas por la quimioterapia (dosis 2 mg/kg).**

Prevención y tratamiento de los **vómitos (dosis 2 mg/kg), en combinación con la solución inyectable de maropitant** y junto con otras medidas de apoyo.


Prevención de los **vómitos provocados por el mareo por movimiento (dosis 8 mg/kg).**



Maropitant

Principio activo antiemético de eficacia probada

Primer comprimido masticable altamente palatable,
divisible en cuartos y en cuatro concentraciones



Emevet®

16 mg / 24 mg / 60 mg / 160 mg

Comprimidos masticables para perros

Maropitant

Eficacia probada en la prevención del vómito en perros.

Tratamiento y prevención de los vómitos (excepto en caso de mareo en el viaje) Prevención de las náuseas inducidas por quimioterapia

Peso	Número de comprimidos		
	16 mg	24 mg	60 mg
1,3 – 2,5	1/4 		
3,0 – 4,0	1/2 		
4,1 – 8,0	1 		
8,1 – 12,0		1 	
12,1 – 24,0		2 	
24,1 – 30,0			1 
30,1 – 60,0			2 

Libertad para viajar
administrando una sola dosis.

¡Buen Viaje!

Prevención del mareo en el viaje

Peso	Número de comprimidos			
	16 mg	24 mg	60 mg	160 mg
1,0 – 1,5		1/2 		
1,6 – 2,0	1 			
2,1 – 3,0		1 		
3,1 – 4,0	2 			
4,1 – 6,0		2 		
6,1 – 7,5			1 	
7,6 – 10,0				1/2 
10,1 – 15,0			2 	
15,1 – 20,0				1 
20,1 – 30,0				1-1/2 
30,1 – 40,0				2 
40,1 – 60,0				2 



...y también, maropitant inyectable **Vominil®**

