IMIDOKAL®

85 mg/ml solución inyectable para bovino y perros
Imidocarbo



56 días
tras la apertura

Mayor flexibilidad de uso en la explotación

La referencia en el tratamiento de la **babesiosis bovina**



- **Tratamiento y prevención de piroplasmosis** causada por *Babesia argentina*, *B. bigemina*, *B. bovis* y *B. divergens*.
- **Tratamiento de anaplasmosis** causada por *Anaplasma marginale*.

ALIVIRA

IMIDOKAL®

85 mg/ml solución inyectable para bovino y perros
Imidocarbo

Babesiosis bovina: una enfermedad con impacto sanitario y económico

Manifestaciones clínicas e impacto en la explotación

- Fiebre
- Abortos
- Anemia y hemoglobinuria
- Pérdidas productivas
- Descenso de la producción láctea
- Apatía y deterioro del estado general

Ventajas que marcan la diferencia:

56 días
Validez tras la apertura

20 ml
Formato práctico

2 acciones
Tratamiento y prevención

	BOVINO	PERROS
Composición	**Imidocarbo 85 mg** (como dipropionato de imidocarbo 121,15 mg)	
Especies de destino	Bovino y perros.	
Indicaciones de uso	Tratamiento y prevención de piroplasmosis causada por *Babesia argentina*, *B. bigemina*, *B. bovis* y *B. divergens*. Tratamiento de anaplasmosis causada por *Anaplasma marginale*.	Tratamiento de piroplasmosis causada por *Babesia canis*, *B. gibsoni* y *B. vogelli*.
Posología y vía de administración	**Vía subcutánea** *Prevención de piroplasmosis:* Administrar 2 mg de imidocarbo/kg p.v. (equivalente a 0,023 ml/kg p.v.) en dosis única. *Tratamiento de piroplasmosis:* Administrar 1 mg de imidocarbo/kg p.v. (equivalente a 0,01 ml/kg p.v.) en dosis única. *Tratamiento de anaplasmosis:* Administrar 2,1 mg de imidocarbo/kg p.v. (equivalente a 0,025 ml/kg p.v.) en dosis única. No inyectar más de 6 ml por punto de inyección.	**Vía intramuscular o intravenosa** *Tratamiento:* Administrar de 4 a 5 mg de imidocarbo/kg de peso corporal (equivalente a 0,047 – 0,058 ml/kg p.c.) en dosis única.
Tiempo de espera	Carne: 213 días. Leche: 6 días	
Período de validez	Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 14 meses Periodo de validez después de abierto el envase primario: 56 días	
Formatos	Vial de 20 ml	

Uso veterinario
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Medicamento administrado exclusivamente por el veterinario en el caso de administración intravenosa o bajo su supervisión y control.

900352_10/2026

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company
Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain
T +34 938 654 148
karizoo@alivira.es
www.alivira.es

ALIVIRA