Betafuse®

Gel para perros

Betametasona+ Ácido fusídico
1 mg/g + 5 mg/g



Alivio
que se nota

NUEVO FORMATO 30g

ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.

Betafuse®

Gel para perros

Betametasona+ Ácido fusídico

Piodermas


Son infecciones cutáneas bacterianas y una de las patologías más frecuentes en la clínica veterinaria.

- ***Staphylococcus pseudintermedius*** es el agente más frecuente.[1]
- ***A menudo son infecciones oportunistas y secundarias a enfermedades sistémicas o dermatológicas.***[1]
- ***Las piodermas son categorizadas de acuerdo con la profundidad de la infección,*** importante para determinar el tratamiento y su duración.

Piodermas secundarias

- **Hipersensibilidades**
- Enfermedades **endocrinas**
- **Conformación** del animal
- Desórdenes de **queratinización**
- Compromiso **inmunológico**

En base a su profundidad encontramos diferentes tipos:





Piodermas de Superficie[1]

Dermatitis Aguda Húmeda	Intertrigo
Dermatitis piotraumática o Hot Spot.	Dermatitis de los pliegues.
Lesión focal, eritematosa, erosiva y exudativa.	Piel húmeda y eritematosa, exudado purulento y dermatitis ulcerativa.
Agravamiento de las lesiones debido a un intenso prurito y autotraumatismo.	Factores predisponentes: ↑ de la temperatura y la humedad del ambiente + la fricción + los microambientes cutáneos protegidos en los pliegues de la piel.
Secundaria a alergias alimentarias, dermatitis atópica, hipersensibilidad a picaduras de pulgas o enfermedades pruriginosas.	Ciertas razas son afectadas con mayor frecuencia debido a su conformación, así como perros obesos y los braquicefálicos.

Crecimiento excesivo superficial de estafilococos.

Betafuse® está indicado para el tratamiento de piodermas de superficie en perros.

FRECUENCIA **2x** DÍA

DURACIÓN **5** DÍAS (min)

¿Cómo usar Betafuse®?



1

Cortar el pelo que cubre la lesión



2

Limpiar el área afectada con un antiséptico



3

Aplicar Betafuse® cubriendo el área afectada



4

Distribuir el producto formando una fina película

Betafuse®

Gel para perros

Betametasona+ Ácido fusídico
1 mg/g + 5 mg/g

Betametasona

*Actividad **antiinflamatoria** y **antiprurítica***



Ácido Fúsidico

Antibiótico activo frente a bacterias Gram +
(Staphylococcus Pseudointermedius y Streptococcus ssp)

Referencia:

[1] Bruyette, D.B. et al. (2020) Clinical Small Animal Internal Medicine. Section 12 Skin and Ear Diseases.

Betafuse® 1 mg/g + 5 mg/g gel para perros. **Composición:** Cada g contiene: 1 mg de Betametasona y 5 mg de ácido fusídico. **Especie de destino:** perros. **Indicaciones**: Tratamiento de pioderma superficial agudo en el perro, como la dermatitis húmeda aguda ("máculas calientes") e intertrigo (dermatitis de los pliegues cutáneos), causados por bacterias Gram + sensibles al ácido fusídico. **Posología y vía de administración:** Uso cutáneo. Se debe cortar el pelo que cubre las lesiones y limpiar el área afectada a fondo con un antiséptico antes de la aplicación. La cantidad aplicada debe cubrir el área afectada con una fina película, aproximadamente 0,5 cm de longitud de gel por 8 cm2 de lesión, 2x al día durante un periodo mínimo de 5 días. **Titular de la autorización de comercialización:** Norbrook Laboratories Ltd, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irlanda. **Nº autorización:** 3483 ESP. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**

ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
karizoo@alivira.es
www.alivira.es

Norbrook®

900114_10/2026